



イオンの力で


除菌 & 抗菌



シールドケアシリーズ

除菌 シールドケア Ag⁺

除菌用の主成分となるエタノールの中に、消臭効果の高い天然柿渋エキスを配合。
さらに銀イオン (Ag⁺) により W 抗菌効果を実現！
日常的に行われる除菌清掃に加え、お客様をお迎えする前や店舗閉店後など無人空間となるタイミングで、ワンショット全量噴射による空間除菌が可能！
面倒な清拭作業や拭取りも不要で手間いらずです。



抗菌 シールドケア Cu²⁺

防汚効果のある撥水性コーティング剤に抗菌効果の高い銅イオンを配合！光触媒系の抗菌コート剤と違い面倒な下地処理は一切不要。水溶性コーティング剤なので扱いやすくあらゆる素材に塗布可能です。また紫外線などの触媒がなくても銅イオンの強力な酸化力でウイルスや菌の増殖を大幅に抑制します。



エアロゾルで空間全体を除菌

銀イオン配合で抗菌 & 防カビ効果

柿渋エキス配合で消臭◎



水溶性で扱い易く安全性◎

銅イオン配合でウイルスの増殖を抑制

様々な素材に塗布可能で接触感染を防止



車内空間の除菌



カビ対策に



大空間の除菌



不特定多数の接触による感染防止



ニオイ対策 & 接触感染防止

<使用方法>

使用前に使用箇所に熱源、火花、裸火、高温のもの等着火源となるおそれのあるものがないことを確認し、全ての窓とドアを閉め密閉して下さい。本製品のプッシュレバーがロックするまで強く押し込むと連続噴射状態になりますので、その場から離れてドアを閉めて下さい。噴射は4分程で終了しますがそのまま10分間は放置して入らないで下さい。放置後全ての窓やドアを開け10分以上換気して下さい。本製品 200mg/缶で約 20 ~ 25 m²の空間に噴霧可能です。

<使用方法>

使用前に十分に攪拌してからご使用下さい。塗布前に塗布面の油分や汚れを除去して下さい。塗布面の乾燥後本製品をスプレーまたはウェスで塗布し、乾拭きで拭き上げて下さい。

除菌シールドケアAg+抗菌性試験結果

【黄色ブドウ球菌】 抗菌活性値 R=5.8

試料	生菌数の常用対数値		抗菌活性値
	接種直後	18時間培養後	
除菌シールドケアAg+	4.36	1.30	5.8
綿標準白布	4.52	7.14	増殖値F:2.6

【大腸菌】 抗菌活性値 R=6.4

試料	生菌数の常用対数値		抗菌活性値
	接種直後	18時間培養後	
除菌シールドケアAg+	4.46	1.30	6.4
綿標準白布	4.61	7.65	増殖値F:3.0

抗菌シールドケアCu²⁺ウイルス不活性化試験結果

【A型インフルエンザウイルス(エンベロープ型ウイルス)】

抗ウイルス活性値 R=4.6

*インフルエンザウイルス・コロナウイルス・SARSウイルス・風疹ウイルスの代替として試験

試験対象	作用時間	PFU/cml			Log(PFU/cml)		抗ウイルス活性R
		N=1	N=2	average	記号	数値	
アルミ板(未施工)	0時間	237,500	206,520	221,875	UO	5.3	-
アルミ板(未施工)	24時間	16,125	39,063	27,594	Ut24	4.4	-
アルミ板(コーティング施工済)	24時間	0.63	0.63	0.63	At1	-0.2	4.6

【ネコカリシウイルス(ノンエンベロープ型ウイルス)】

抗ウイルス活性値 R=5.2

*ノロウイルス・ロタウイルス・ポリオウイルス・アデノウイルスの代替として試験

試験対象	作用時間	PFU/cml			Log(PFU/cml)		抗ウイルス活性R
		N=1	N=2	average	記号	数値	
アルミ板(未施工)	0時間	762,500	831,250	796,875	UO	5.9	-
アルミ板(未施工)	24時間	89,063	117,500	103,281	Ut24	5.0	-
アルミ板(コーティング施工済)	24時間	0.63	0.63	0.63	At1	-0.2	5.2

*抗菌・抗ウイルス活性値Rについて：Rの値が2.0≦R<3.0の範囲で抗菌効果が認められる。3.0≦Rの場合は強い効果が認められるとされています。

除菌施工済
シール配布中

只今ご注文いただくと、
抗菌施工済のオリジナル
ステッカーをプレゼント！
感染対策のアピールにご
活用下さい。



【販売元】

株式会社 レッツクリエイト

〒344-0123 埼玉県春日部市永沼 1947-1

TEL: 048-718-3611 / FAX: 048-718-3612

お問い合わせはコチラから: <http://www.inspire-pro.com/>

